

## Bipacksedel

# Flutide Nasal 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

**Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. Flutide Nasal nässpray måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spar denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apoteket om du behöver mera information eller råd.
- Du måste uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

### Vad innehåller läkemedlet?

*Verksamt ämne:* flutikasonpropionat 50 mikrogram per dos.

*Övriga innehållsämnen:* vattenfri glukos, Avicel RC 591 (mikrokristallin cellulosa + natriumkarboximetylcellulosa), konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 20 mikrogram, fenetanol 0,25 mikroliter), Polysorbat 80, renat vatten.

En flaska innehåller 60 doser (8 ml). Glasflaskan är försedd med dospump.

### Hur verkar läkemedlet?

Flutide Nasal är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser.

### Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 SOLNA

### Information lämnas av

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  
Köpenhamn, Danmark

### Kontakts via

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  
Box 5196, 200 71 Malmö  
tel 020-22 66 70

### Vad används läkemedlet mot?

Flutide Nasal används mot snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Flutide Nasal kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s k vasomotorisk snuva), men *inte* vid vanlig förkylningssnuva.

### När ska du inte använda Flutide Nasal?

Du ska inte använda Flutide Nasal om du är överkänslig mot flutikasonpropionat eller något av de övriga innehållsämnen.

### Att tänka på innan och när läkemedlet används

Vid allergiska symtom från ögonen, eller under de första dagarna när du använder Flutide Nasal kan kompletterande behandling behövas.

Om du redan använder kortison (för inhalation, tabletter eller kräm/salva) för t ex astma eller eksem, ska du inte använda Flutide Nasal utan att rådfråga din läkare.

Tala med din läkare innan du börjar använda Flutide Nasal om du har någon av följande sjukdomar:

- svamp- eller herpesinfektion i näsan
- om du har feber eller infektion i näsan eller bihålorna
- nyligen blivit opererad i näsan eller har skadat näsan eller har sår i näsan
- lungtuberkulos
- svår leversjukdom

### **Graviditet**

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare *före* användning under graviditet.

### **Amning**

Okänt om Flutide Nasal går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare *före* användning under amning.

### **Trafikvarning**

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Viktig information om något av hjälpämnen i Flutide Nasal**

Flutide Nasal innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på huden och kan ge hudreaktioner.

### **Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel**

Om Flutide Nasal används samtidigt med vissa andra läkemedel, t ex ketokonazol och itraconazol (mot svampinfektioner) och ritonavir (mot hiv), kan risken för biverkningar öka. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

### **Hur ska du använda läkemedlet?**

Dosering till *vuxna och barn från 12 år*: 1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen under högst 3 månader. Denna dosering ska *inte* överskridas.

Börja med 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen, helst på morgonen. När du förbättrats och symtomen är under kontroll minskas dosen till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång per dag.

Flutide Nasal ger ofta *lindring* efter några timmar, men *full effekt* erhålls först efter några dagars regelbunden användning.

*Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare.*

*Kontakta även läkare om läkemedlet behöver användas dagligen i mer än 3 månader.*

Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.

Skaka nässprayen före användning. I övrigt, se bruksanvisningen.

Används *inte* till barn under 12 år utan läkares anvisning.

Om du fått Flutide Nasal på recept bestämmer läkaren dosen så att den passar för dig. Följ läkarens ordination noggrant.

### **Vad ska man göra om man tagit för stor dos?**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

### **Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?**

Biverkningar indelas i *mycket vanliga* (förekommer hos fler än 1 person av 10), *vanliga* (fler än 1 person av 100), *mindre vanliga* (färre än 1 person av 100), *sällsynta* (färre än 1 person av 1000) och *mycket sällsynta* (färre än 1 person av 10 000).

*Mycket vanliga:* Nysningar genast efter sprayning. Lätt blodblandat nässekret.

*Vanliga:* Torrhet/irritation i näsan. Huvudvärk. Obehaglig lukt eller smak som kan bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedlets egenskaper.

*Mycket sällsynta:* Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, kramp i luftrören, svullnad i ansikte, munhåla och svalg, anafylaktiska reaktioner/chock (en typ av allergisk reaktion/chock). Kontakta då omedelbart läkare.

Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Orsaken till dessa biverkningar är oklar. Glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr).

### **Förvaring och hållbarhet**


Förvaras vid högst 30°C. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

### **Förvaras utom syn- och räckhåll för barn**

Denna bipacksedel godkändes senast 2006-03-31

### **Bruksanvisning**

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder Flutide Nasal.



Innan du använder en ny flaska med Flutide Nasal nässpray eller om sprayen inte har använts på en vecka, ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften tills en jämn dusch erhålls. Håll flaskan ifrån dig när du testsprayar i luften.

Skaka flaskan.

Ta av plasthatten genom att trycka på skårorna på sidan av plasthatten och drag av den (vrid inte).

Håll sprayflaskan som på bilden.

Låt den vila på tummen och placera långfingret och pekfingret på var sin sida om flaskans spets. Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa nedåt mot tummen.



Snytt ur näsan.

Håll sprayflaskan som på bilden.

Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren.

För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en gång.

Andas samtidigt lätt in genom näsborren.


Andas därefter ut, innan sprayningen upprepas en gång.

Upprepa proceduren i andra näsborren.

Torka av näsapplikatorn och sätt på plasthatten igen.

Överskrid inte doseringen!

## Rengöring



Rengör den vita plastdelen (näsapplicatorn) minst en gång i veckan. Rengör den oftare om den täpps till.

*Peta inte med nål eller annat vasst föremål i näsapplicatorn.*

Tag av näsapplicatorn.

Spola under rinnande varmt vatten.

Skaka av vattnet och låt lufttorka.

Sätt tillbaka näsapplicatorn och plasthatten.

Om näsapplicatorn 'pluggar' igen kan den ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan med kallt vatten och låt lufttorka.

Sätt tillbaka delarna.